

Floramite[®]
240 SC

فلورامايت
Floramite[®]
240 SC

Bifenazate

ACARICIDE

فعالية عالية على جميع أطوار العناكب
Excellente efficacité sur tous les stades des acariens

Les bonnes raisons de choisir **Floramite**[®] 240 SC

- Une nouvelle famille chimique, pas de résistance croisée
- Efficace sur tous les stades des *acariens rouges* et des *acariens jaunes* du palmier dattier.
- Activité par contact; une bonne couverture de la culture est nécessaire
- Cessation rapide de l'alimentation
- Longue activité résiduelle
- Sélectif pour la plupart des acariens prédateurs testés
- Très sélectif pour toutes les cultures testées
- Pas de résidus
- Un excellent outil dans les programmes de gestion de la résistance IRM
- Compatible avec les programmes de lutte intégrée IPM.

Usage et doses d'emploi :

Agrumes, palmier-dattier : Acariens : 60 ml/hl

الإستعمالات و المقادير :

القوارص و التمور : العناكب : 60 مل/هـل



- Nouveau groupe chimique.
- Efficace sur tous les stades d'acariens (oeufs, larves, nymphes, adultes).
- Inhibition rapide de l'alimentation.
- Longue activité résiduelle.
- Court délai avant récolte.
- Sélectivité parfaite sur toutes les cultures testées.
- Inoffensif sur les auxiliaires.

Distribué par :



agrimatco

Agrimatco Tunisie
Angle rue de l'électricité et rue d'Oran
Z.I. Ben Arous 2013 Tunisie
Tél. : +216 79 391 791 - Fax : +216 71 382 206
www.agrimatco.tn



Arysta LifeScience Netherlands B.V.
Ankerweg 1041 18 AT Amsterdam,
Netherlands
www.arystalifescience.eu

Use plant protection products safely.
Always read the label and product information before use.
Floramite 240 SC is a registered trademark of Arysta LifeScience SAS

Distribué par :



agrimatco

Agrimatco Tunisie
Angle rue de l'électricité et rue d'Oran
Z.I. Ben Arous 2013 Tunisie
Tél. : +216 79 391 791 - Fax : +216 71 382 206
www.agrimatco.tn





FLORAMITE® 240 SC

Acaricide pour les cultures légumières, arboricoles
et Palmier Dattier

Composition	Bifénazate 240 g/L
Formulation	Suspension concentrée (SC)
Famille chimique	Carbazates
Homologation N°	I.008 - 16

فلورامايت® 240 SC



Mode d'action - Propriétés :

FLORAMITE® 240 SC contrôle toutes les formes des acariens notamment les Tétranyques et les Oligonychus (acarien jaune du palmier dattier «BOUFAROUA»). **FLORAMITE 240 SC** agit par contact et bénéficie d'une bonne persistance d'action et d'un délai avant récolte (DAR) très court .

Usage et doses Homologués :

Culture	Ravageur	Dose	Nombre maximal d'application
Agrumes	Acariens	60ml / hl	2
Palmier Dattier	Acariens «BOUFAROUA»	50ml / hl	2

Recommandations d'emploi

- Procéder à l'application dès l'apparition des premiers acariens. Sur cultures au feuillage dense, situation où les acariens sont difficilement accessibles, le traitement doit être renouvelé après 7 jours.
- En cas d'utilisation de **FLORAMITE® 240 SC** en mélange, celui-ci doit être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques agricole.

Stratégies d'utilisation

Dans le cadre des stratégies à mettre en place pour la gestion de la résistance, il est recommandé :



- De ne pas excéder 2 applications de **FLORAMITE® 240 SC** par parcelle et par an en respectant un intervalle minimal de 7 jours entre les applications .
- D'utiliser **FLORAMITE® 240 SC** dans un programme en alternance avec des produits de familles chimiques différentes.
- D'appliquer **FLORAMITE® 240 SC** dès les premières infestations. Ne pas attendre des niveaux d'infestation importants.
- D'appliquer **FLORAMITE® 240 SC** aux doses d'emplois recommandées.
- D'introduire les techniques de protection intégrée dans les stratégies de contrôle des acariens.

Effet sur la faune auxiliaire

FLORAMITE® 240 SC est neutre à faiblement toxique pour les insectes auxiliaires. Son emploi est compatible avec les stratégies de lutte intégrée IPM.

Sensibilité des végétaux traités

Aucune sensibilité particulière n'a été notée concernant les cultures légumières traitées avec **FLORAMITE® 240 SC**.
FLORAMITE® 240 SC a présenté d'autre part une totale sélectivité dans les essais réalisés sur de nombreuses espèces.



التعريف و طريقة التأثير

فلورامايت® مبيد عناكبي يؤثر باللمس و البلع على جميع الأطوار المتحركة بالإضافة إلى البيوض. يتميز فلورامايت® بفعالية طويلة الأمد تمتد من 3 إلى 4 أسابيع و بفترة انتظار قبل الجني قصيرة نسبيا تقدر ب 3 أيام فقط.

مقادير و توصيات الإستعمال

الزراعة	الآفة	مقدار الإستعمال	عدد الرشاشات
القوارص	العناكب	60 مل/هل	2
نخيل التمور	العناكب الصفراء «بوفرو»	50 مل/هل	2

- تقع المداواة عند ظهور الأطوار الأولى للعناكب.
- كمية الماء الواجب إستعمالها تختلف حسب حجم الأشجار. في كل الحالات يجب رش الأشجار حتى السيلان.
- في حالة إستعمال فلورامايت® مخلوط مع مبيدات أخرى، يجب إحترام التوصيات العامة المعمول بها عند خلط المبيدات.
- يمكن خلط فلورامايت® مع المبيدات الحشرية و الفطرية المرخصة.

التأثير على الحشرات النافعة

فلورامايت® غير ضار بالحشرات النافعة. إستعماله ينسجم جيدا مع مكافحة المندمجة للآفات IPM.

الانتقائية

فلورامايت® يتميز بانتقائية عالية للزراعات المعالجة.